

Définition

Les antalgiques de palier 3 sont appelés opioïdes forts ou morphiniques.

La morphine est l'un des médicaments antidouleur les plus efficaces dont on dispose. La morphine est issue de l'opium.

Tout patient présentant des douleurs très intenses ou résistantes aux autres antalgiques doit bénéficier de la morphine.

Respecter les règles d'administration hospitalière des stupéfiants :

- × le contrôle de la prescription (nominative, signée et datée par le médecin, dosage et quantité écrits en toutes lettres)
- × le coffre des toxiques (banalisé et fermé à clef, lieu de stockage des stupéfiants du service)
- × l'enregistrement sur le relevé nominatif (cahier des toxiques)
- × les ampoules et les emballages vides sont conservés dans le coffre

Surveillance infirmière

Respecter les délais d'administration et l'arrêt de la morphine doit être progressif pour éviter un syndrome de sevrage. Il faut expliquer au patient l'importance du respect des posologies et des délais entre deux prises.

Contrôler l'efficacité de la morphine (comme celui de tous les antalgiques): identifier la douleur, la caractériser, l'évaluer à l'aide d'échelles...

Dépister et surveiller les effets secondaires mais également repérer les signes de surdosage.

L'approvisionnement et la délivrance de la morphine dépendent de la réglementation de la liste des stupéfiants. L'inscription sur le relevé nominatif est obligatoire à l'hôpital.

Les dérivés morphiniques sont d'autres antalgiques majeurs, préférés quelquefois à la morphine.

Antalgiques (palier 3)

www.fiches-ide.com

MOSCONTIN[®], MORPHINE[®], SKENAN[®], FENTANYL[®], NUBAIN[®],
OXYCONTIN[®], SEVREDOL[®]

Antidote: NARCAN[®] (Naloxone)

Effets indésirables

Troubles psychiques : dépendance, somnolence et sédation, phénomènes d'hallucination et de délire

Troubles digestifs : nausées, vomissements, constipation

Troubles urinaires : rétention urinaire

Troubles respiratoires : bradypnée, dépression respiratoire avec risque de bronchospasme mortel

Troubles cardio-vasculaires : bradycardie, hypotension

Signes de surdosage

Bradypnée avec risques d'arrêt respiratoire, le sommeil pouvant aller jusqu'au coma.

Syndrome de sevrage

Anxiété, irritabilité, frissons, sudation, bouffées de chaleur, arthralgies, mydriase, larmoiement, rhinorrhée, nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhées