

Indications

Douleurs abdominales (urinaires, gynécologiques ou obstétriques)

Crampes intestinales

En postopératoire, ils sont utilisés pour prévenir l'iléus paralytique dû à l'intervention abdominale. Ils stimulent la reprise du transit.

Ils sont utilisés pour traiter la colopathie fonctionnelle, s'exprimant par l'alternance de diarrhée et de constipation. Ils sont alors prescrits à long terme et régularisent le transit.

Mode d'action

Les antispasmodiques suppriment les contractures douloureuses des fibres lisses et font disparaître les spasmes.

Ils calment les douleurs abdominales et les crampes intestinales.

Antispasmodiques

www.fiches-ide.com

Surveillance infirmière

Evaluation de la douleur

Surveiller le retour du transit intestinal en postopératoire :
apparition de gaz, absence de vomissement

Surveiller l'amélioration des signes pour les colopathies

Conseils

Boire +++ sauf si contre-indication

Spasmolytiques musculotropes

Effets indésirables : épigastralgie

**DEBRIDAT[®], SPASFON[®],
DUSPATALIN[®]**

Antispasmodiques anticholinergiques

Effets indésirables : sécheresse de la bouche, constipation, rétention urinaire, troubles de l'accommodation visuelle ; hypotension réactionnelle et tachycardie

SPASMODEX[®], VISCERALGINE[®]