

### Indications

Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique au cours d'affections bronchiques (surtout aiguës).

Ce traitement permet de diminuer ou de prévenir les encombrements bronchiques en fluidifiant les sécrétions bronchiques.

Ils sont utilisés en complément des antibiotiques et des anti-inflammatoires.

Ils ont également un rôle préventif en postopératoire pour lutter contre l'encombrement bronchique dû à l'alitement, l'intervention et les anesthésiques.

### Contre-indications

Ulcère gastroduodéal évolutif

Voies inhalée ou intratrachéale contre-indiquées en cas de bronchospasme

## Fluidifiants bronchiques

[www.fiches-ide.com](http://www.fiches-ide.com)

**MUCOMYST®**, **RHINATHIOL®**, **BRONCHOKOD®**, **MUCOTHIOL®**,  
**VECTRINE®**, **SURBRONC®**, **BISOLVON®**

### Effets indésirables

Gastralgies, nausées et vomissements, diarrhée (réduire la dose)

Risque d'inondation bronchique chez le malade incapable d'expectorer, indiquant une aspiration bronchique en urgence.

**Exceptionnels :** céphalées, vertiges, somnolence, réactions allergiques

Voie locale : toux, bronchospasme

### **Surveillance infirmière**

Favoriser l'expectoration : il faut mettre le patient en position demi-assise puis le faire tousser et cracher régulièrement

Constater l'efficacité du traitement : lorsque disparaissent les signes physiques de l'encombrement bronchique et lorsque la respiration est améliorée et la quantité de crachats augmentée. Il faut écouter la respiration pour repérer les encombrements bronchiques qui s'expriment par des ronflements pulmonaires et une toux grasse

Dépister les effets secondaires