Acupan® (Nefopam)

Médicaments

fiches-ide.fr

Généralités

Acupan® (Nefopam) un analgésique central non morphinique par inhibition de la recapture de la sérotonine, noradrénaline et dopamine.

Pharmacocinétique

- Délai d'action : 15 min
- Durée d'action : 3 à 5 h
- Demi vie d'élimination : 4 h
- Métabolisme hépatique
- Élimination urinaire

Pharmacodynamie

- Anti-hyperalgésique par blocage des canaux sodiques
- Réduction des frissons post-opératoires
- Activité anticholinergique

Présentation

Ampoules de 20mg/2ml (10 mg/ml)
Comprimés de 30mg

Indications

Traitement symptomatique des affections douloureuses aiguës, notamment des douleurs post-opératoires

Effets indésirables

Confusion, vertiges
Nausées, vomissements
Tachycardie, palpitations
Sécheresse buccale
Constipation
Rétention urinaire
Sueurs
Somnolence
Malaise
Convulsions
Réaction allergique
Douleur au site d'injection

Contre-indications

Allergie
Enfant < 15 ans (absence d'étude clinique)
Convulsions ou antécédents de convulsions
Risque de rétention urinaire (troubles urétroprostatiques)
Risque de glaucome par fermeture de l'angle

Interactions médicamenteuses

Associations déconseillées : alcool
Associations à prendre en compte : autres médicaments sédatifs

. Fiche rédigée par Julie VIOLET, créa-rédactrice de Fiches IDE - Fiches IDE© Tous droits réservés

Administration et surveillance

Administration

- Intraveineuse lente sur plus de 15 minutes (patient allongé afin d'éviter la survenue d'effets indésirables), intramusculaire profonde ou per os
- Précautions chez le patient avec pathologie cardiovasculaire (effets tachycardisants), chez le sujet âgé en raison des effets anticholinergiques, chez l'insuffisant rénal ou hépatique

Surveillance

- Apparition des effets indésirables
- Évaluation de la douleur avant et après l'administration

Posologies

IV ou IM : 20mg toutes les 4 à 6 heures à renouveler sans dépasser 120 mg/j

IVSE : 80 à 120 mg/24h

- 80mg/24h : 4 ampoules (8ml) + 40ml de NaCl 0,9% avec un débit à 2ml/h
- 120mg/24h : 6 ampoules (12ml) + 36ml de NaCl 0,9% avec un débit à 2ml/h

Per os : dose initiale de 1 à 2 comprimés, jusqu'à 6 comprimés par jour

. Fiche rédigée par Julie VIOLET, créa-rédactrice de Fiches IDE - Fiches IDE© Tous droits réservés

Médicament Antalgique

Acupan® (Nefopam)

Généralités

Analgésique central non morphinique par inhibition de la recapture de la sérotonine, noradrénaline et dopamine.

Pharmacocinétique
Délai d'action : 15 min
Durée d'action : 3 à 5 h
Demi-vie d'élimination : 4 h
Métabolisme hépatique
Élimination urinaire

Pharmacodynamie
Anti-hyperalgésique par blocage des canaux sodiques
Réduction des frissons post-opératoires
Activité anticholinergique

Indications

Traitement symptomatique des affections douloureuses aiguës, notamment des douleurs post-opératoires

Contre-indications

Allergie
Enfant < 15 ans (absence d'étude clinique)
Convulsions ou antécédents de convulsions
Risque de rétention urinaire (troubles urétroprostatiques)
Risque de glaucome par fermeture de l'angle

Effets indésirables

Confusion, vertiges
Nausées, vomissements
Tachycardie, palpitations
Sécheresse buccale
Constipation
Rétention urinaire
Sueurs
Somnolence
Malaise
Convulsions
Réaction allergique
Douleur au site d'injection

Présentation

Ampoules de 20mg/2ml (10 mg/ml)

Comprimés de 30mg

Posologies

IV ou IM 20mg toutes les 4/6 h (max 120mg/j)

IVSE 80 à 120 mg/24h
80mg/24h : 4 ampoules (8ml) + 40ml de NaCl 0,9% avec un débit à 2ml/h
120mg/24h : 6 ampoules (12ml) + 36ml de NaCl 0,9% avec un débit à 2ml/h

Per os : dose initiale de 1 à 2 comprimés, jusqu'à 6 comprimés par jour

Administration et surveillance

Administration
IVL + de 15 minutes (patient allongé afin d'éviter la survenue d'effets indésirables), IM profonde ou PO
Précautions chez le patient avec pathologie cardiovasculaire (effets tachycardisants), chez le sujet âgé en raison des effets anticholinergiques, chez l'insuffisant rénal ou hépatique

Surveillance : effets indésirables, évaluation douleur

Interactions

Associations déconseillées
- Alcool

Associations à prendre en compte
- Autres médicaments sédatifs

FICHES IDE
fiches-ide.fr
Fiches IDE© Tous droits réservés