

Généralités

Droleptan® (Dropéridol) est un neuroleptique de la classe des butyrophénones avec un effet antiémétique.

Pharmacodynamie

- Blocage des récepteurs dopaminergiques
- Faible action α -1 adrénolytique

Pharmacocinétique

- Délai d'action : 2 à 3 minutes
- Effets relaxants et sédatifs pouvant persister pendant 2 à 4 heures
- Élimination urinaire sous forme de métabolites inactifs



Présentation

Ampoule injectable IV de 1,25mg/ml et 2,5 mg/ml

Effets indésirables

Somnolence
Allongement de l'intervalle QT
Tachycardie
Vertiges
Hypotension artérielle
Anxiété, agitation
Syndrome malin des neuroleptiques

Indications

Prévention et traitement des nausées/vomissements postopératoires (NVPO) chez les adultes présentant un risque modéré à sévère, et en seconde intention chez les enfants de 2 à 18 ans

Prévention des nausées/vomissements induits par les morphiniques en analgésie auto-contrôlée en postopératoire chez l'adulte (PCA)

Interactions médicamenteuses

Autres dépresseurs du système nerveux central
Métoclopramide et autres neuroleptiques : augmentation des syndromes extrapyramidaux
Médicaments provoquant des torsades de pointes
Autres médicaments connus pour allonger l'intervalle QT
Potentialisation de l'action des sédatifs et des antihypertenseurs

Contre-indications

Hypersensibilité au produit
Allongement de l'intervalle QT
État comateux
Hypokaliémie ou hypomagnésémie
Bradycardie < 55/min
Traitement concomitant connu pour induire une bradycardie
Dépression sévère
Maladie de Parkinson
Phéochromocytome

Administration et surveillance

Administration

- Voie intraveineuse
- Injection lente 30 minutes avant la fin de la chirurgie
- Intervalle de 6 heures entre 2 prises

Surveillance

- ECG (risque allongement QT, troubles du rythme)
- Pression artérielle
- État neurologique (risque de syndrome malin)
- Présence de nausées/vomissements postopératoires

Posologies

Prévention et traitement des NVPO

- Adultes : 0,625 à 1,25 mg (0,625 mg pour les patients âgés, et les insuffisants rénaux/hépatiques)
- Enfants à partir de 2 ans : 10 à 50 µg/kg (maxi 1,25 mg)

Prévention des nausées/vomissements induits par les morphiniques en PCA

- Adultes : 15 à 50 µg/mg de morphine (sans dépasser 5 mg/j)
- Enfants : non indiqué dans la PCA

Propriétés

Neuroleptique de la classe des butyrophénones avec un effet antiémétique.

Pharmacodynamie

Blocage des récepteurs dopaminergiques
Faible action α -1 adrénolytique

Pharmacocinétique

Délai d'action : 2 à 3 minutes
Effets relaxants et sédatifs pouvant persister pendant 2 à 4 heures
Élimination urinaire sous forme de métabolites inactifs

Indications

Prévention et traitement des nausées/vomissements postopératoires (NVPO) chez les adultes présentant un risque modéré à sévère, et en seconde intention chez les enfants de 2 à 18 ans

Prévention des nausées/vomissements induits par les morphiniques en PCA en postopératoire chez l'adulte (PCA)

Contre-indications

Hypersensibilité au produit
Allongement de l'intervalle QT
État comateux
Hypokaliémie ou hypomagnésémie
Bradycardie < 55/min
Traitement concomitant connu pour induire une bradycardie
Dépression sévère
Maladie de Parkinson
Péochromocytome

Présentation

Ampoule injectable IV de 1,25mg/ml et 2,5 mg/ml

Médicament Anti-émétique

Droptan®
(Droperidol)



fiches-ide.fr

Fiches IDE© Tous droits réservés

Effets indésirables

Somnolence
Allongement de l'intervalle QT
Tachycardie
Vertiges
Hypotension artérielle
Anxiété, agitation
Syndrome malin des neuroleptiques

Administration et surveillance

Administration

Voie intraveineuse
Injection lente 30 minutes avant la fin de la chirurgie
Intervalle de 6 heures entre 2 prises

Surveillance

ECG (risque allongement QT, troubles du rythme)
Pression artérielle
État neurologique (risque de syndrome malin)
Présence de nausées/vomissements postopératoires

Interactions

Autres déprimeurs du système nerveux central
Métoclopramide et autres neuroleptiques
Médicaments provoquant des torsades de pointes
Autres médicaments allongeant l'intervalle QT
Potentialisation de l'action des sédatifs et des antihypertenseurs

Posologies

Prévention / traitement NVPO

Adultes **0,625 à 1,25 mg**

Enfants > 2 ans **10 à 50 µg/kg** (max 1,25 mg)

Prévention nausées/vomissements induits par morphiniques en PCA

Adultes **15 à 50 µg/mg** de morphine (sans dépasser 5mg/j)

Enfants non indiqué dans la PCA