PARAMÈTRES VITAUX

Valeurs indicatives — à interpréter selon le contexte clinique

fiches-ide.fr	1 mois	1 an	2 ans	5 ans	10 ans	Adulte
Pression artérielle*	PAS 75 mmHg	PAS 95 mmHg	PAS 98 mmHg	PAS 100 mmHg	PAS 110 mmHg	120/80 mmHg
Fréquence cardiaque	110-180 bpm	100-170 bpm	90-160 bpm	70-140 bpm	60-120 bpm	60-100 bpm
Saturation en oxygène	95-100% en air ambiant (hors premières minutes de vie)					
Fréquence respiratoire	25-60 mvt/min	20-50 mvt/min	18-40 mvt/min	17-30 mvt/min	14-25 mvt/min	12-20 mvt/min
Température	36,5-37,5°C					
Glycémie	À jeun : 0,70-1,10 g/L (3,9-6,1 mmol/L) (valeurs à jeun hors période néonatale)					
Diurèse**	1-3 ml/kg/h	1-2 ml/kg/h				0,5-1 ml/kg/h

***Pression artérielle** : chez l'enfant, seule la pression artérielle systolique (PAS), correspondant au premier chiffre de la tension, est indiquée. Les valeurs présentées sont des valeurs de référence indicatives selon l'âge.
Elles ne représentent pas les limites à partir desquelles la tension est considérée comme trop basse.

****Diurèse** : valeurs indicatives exprimées en millilitres d'urine par kilogramme de poids et par heure (mL/kg/h). Elles varient notamment selon l'âge, l'hydratation et le contexte clinique.